



# Bilan Mensuel de l'Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe et de la Sismicité Régionale

No. 2004-10 – octobre 2004



ISSN 1622-4523

page 1 sur 2

## A - Activité Volcanique de la Soufrière de Guadeloupe

La Soufrière de Guadeloupe est un volcan actif de type explosif ayant connu de nombreuses éruptions magmatiques et phréatiques par le passé. Son activité sismique, fumerollienne et thermique est globalement en lente augmentation depuis 1992. Si cette activité incite l'observatoire à la vigilance instrumentale, elle n'est cependant pas associée à une anomalie des paramètres de surveillance liés à une éventuelle remontée de magma (séismes profonds, déformations à grande échelle, gaz soufrés à haute température). Sur base des observations de l'OVSG-IPGP enregistrées au cours du mois d'octobre 2004 et résumées ci-dessous, aucune activité éruptive n'est à prévoir prochainement.

Cependant, les émanations gazeuses aux abords et sous le vent des fumerolles du Cratère Sud présentent, depuis 1998, des risques avérés d'irritation et de brûlures (yeux, peau, voies respiratoires). Selon l'arrêté municipal N°01-296 de la ville de Saint-Claude, seules les zones du sommet éloignées des fumerolles acides et nocives sont accessibles au public. Des barrières mises en place par le Parc National délimitent en partie cette zone interdite.

**Sismicité volcanique** : au cours du mois, l'observatoire a enregistré **54** séismes d'origine volcanique, localisés sous le massif de la Soufrière à moins de 1 km de profondeur. La magnitude maximale est de **0.9** et l'énergie cumulée est de **0.5 MJ**. Ces événements se sont présentés principalement sous forme d'essaim de séismes les 24 et 25 octobre 2004. Aucun séisme profond n'a été détecté. Cette sismicité superficielle et de faible énergie, observée depuis 1992, est probablement liée à l'activité du système hydrothermal de la Soufrière (circulations et interactions de gaz, vapeur et eau sous pression dans la roche poreuse et fracturée).

**Activité fumerollienne** : élevée avec de forts débits au Cratère Sud, des températures de gaz stables (**101.7 °C** max), une acidité très marquée (pH entre **0.7** et **1.0**) et d'importants dépôts de soufre solide. La vasque acide avait une acidité extrême (pH **-0.3**), un niveau assez bas avec des projections jusqu'à 2-3 m de distance. Persistance de gouttelettes d'acide chlorhydrique mélangées aux gaz volcaniques (**H<sub>2</sub>S**, **HCl**, **SO<sub>2</sub>**) en concentration non négligeable dans un rayon de 50 m environ et sous le vent des fumerolles. Maintien de l'activité sur les autres gouffres (Tarissan et Napoléon).

**Sources thermales** : certaines sources proches du volcan maintiennent une très faible et lente augmentation de température alors que d'autres sont stables ou en baisse (mesures du **27 et 28 octobre 2004** : Eaux Vives **47.6 °C**, 2<sup>ème</sup> Chute du Carbet **45.4 °C**, Galion **44.5 °C**, Tarade **37.1 °C**, Pas du Roy **32.6 °C**, Habitation Revel **32.3 °C**, Bains Jaunes **30.1 °C**, Carbet-Échelle **22.3 °C**). Les propriétés physico-chimique restent normales (acidité, conductivité électrique, concentrations ioniques).

**Forages** : les températures de fonds de forages sont stables : Col de l'Échelle (-76 m) **22.8 °C** (en baisse régulière depuis 1977), Savane à Mulets (-96 m) **30.1 °C**.

**Déformations** : pas de déformations significatives de l'édifice en inclinométrie (Breislack, Fente du Nord, Rivière Noire, Rivière du Galion, Cave de Tarade). Les stations GPS continu (sommet Piton Sanner et Houëlmont) sont en cours de réparation.

**Phénoménologie** : Les émanations acides et le vent maintiennent le dépérissement de la végétation sur la partie Sud du sommet et sur les flancs Sud-Ouest et Ouest du volcan.

**Météorologie au sommet** : au cours du mois, pluviosité cumulée de **647 mm**, ensoleillement moyen de **145 W/m<sup>2</sup>**, vents de vitesse moyenne **21 km/h** (maximum **72 km/h**) et de direction moyenne **Est-Sud-Est** (mais extrêmement variable sur la période).

## B – Activité Tellurique Régionale

L'arc insulaire des Petites Antilles résulte du plongement de la plaque Atlantique sous la plaque Caraïbe. C'est une subduction active avec une vitesse de rapprochement de 2 cm/an, faisant de notre archipel une région à forts aléas volcanique et sismique. Certains séismes sont directement liés au processus de subduction et sont en général profonds. D'autres plus superficiels et souvent moins forts résultent de la déformation de la plaque Caraïbe. Durant la période historique, plusieurs séismes ont causé des dégâts en Guadeloupe (les plus forts en 1735, 1810, 1843, 1851 et 1897).

Actuellement, l'Observatoire enregistre une moyenne de 60 séismes par mois dont certains peuvent être ressentis. Les séismes ne sont pas prévisibles et peuvent survenir à n'importe quel moment.

**Sismicité régionale :** l'Observatoire a enregistré au cours du mois, dans un rayon de 450 km autour de la Guadeloupe, un total de **68** séismes d'origine tectonique de magnitude maximale **4.0**. Aucun événement n'a été signalé ressenti en Guadeloupe, mais deux séismes ont été ressentis à Montserrat et un en Martinique.

**Volcanisme Montserrat :** L'activité du volcan Soufriere Hills a légèrement remonté et est dominée par quelques séismes d'amplitudes et de durées variables. Le dégazage de soufre est moyen à fort avec un maximum de **1100 t/j** de SO<sub>2</sub> atteint les 5 et 15 octobre 2004. Cette activité peut changer rapidement ; le volcan et la zone dévastée restent exposés à des phénomènes volcaniques particulièrement dangereux (explosions, nuées ardentes, coulées de boue). L'accès au volcan, aux zones alentours et aux abords de l'île sont interdits ou soumis à restriction. Pour plus d'information, reportez-vous au site Internet du MVO <http://www.mvo.ms/>.

**Volcanisme Dominique :** Informations sur le site <http://www.uwiseismic.com>.

Le 9 novembre 2004  
Dr François Beauducel  
Directeur et Responsable Scientifique

### Annexe : Définition des niveaux d'activité volcanique pour la Soufrière de Guadeloupe

Activité globale observée	Minimale niveau de base	En augmentation variations de quelques paramètres	Fortement augmentée variations de nombreux paramètres, sismicité fréquemment ressentie	Maximale sismicité volcanique intense, déformations majeures, explosions
Délais possibles	Siècle(s) / Années	Année(s) / Mois	Mois / Semaines	Imminente / En cours

Décision ← OVSIG-IPGP → ← Préfecture →

Niveaux d'alerte	VERT = Pas d'alerte	JAUNE = Vigilance	ORANGE = Pré alerte	ROUGE = Alerte
------------------	---------------------	-------------------	---------------------	----------------

**Merci aux organismes, collectivité et associations d'afficher publiquement ce bilan pour une diffusion la plus large possible. Pour le recevoir par e-mail, écrivez à [info@ovsg.univ-ag.fr](mailto:info@ovsg.univ-ag.fr)**  
**Les informations de ce document ne peuvent être utilisées sans y faire explicitement référence.**